

Departamento de Registro Farmacéutico

PATANOL[®] (clorhidrato de olopatadina al 0,1%)
PATANOL-S[®] (clorhidrato de olopatadina al 0,2%)

Folleto de información al paciente

Versión 2.0

Fecha de entrada en vigor: 17 de julio de 2020

N.º de referencia (SLC): No aplicable

Versión del documento: Última

Propiedad de Novartis
Confidencial

No se usará, divulgará, publicará ni dará a conocer
sin el consentimiento de Novartis

Lea todo el prospecto detenidamente antes de empezar a usar este medicamento.

Conserve este prospecto. Puede que necesite leerlo de nuevo.

Este medicamento se lo han recetado solo a usted. No lo utilice para ninguna otra afección y tampoco se lo dé a otra persona. Si lo hace, puede perjudicar la salud de esa persona, aunque presente los mismos signos de enfermedad que usted.

Si algún efecto secundario lo afecta mucho o nota algún efecto secundario no mencionado en este prospecto, dígaselo al médico, farmacéutico o profesional sanitario que lo atiende.

Si tiene dudas, pregunte al médico, al farmacéutico o al profesional sanitario que lo atiende.

Contenido de este prospecto

- 1 Qué es PATANOL / PATANOL S y para qué se utiliza
- 2 Qué debe saber antes y durante el tratamiento con Patanol / Patanol S
- 3 Cómo usar Patanol / Patanol S
- 4 Posibles efectos secundarios
- 5 Conservación de Patanol / Patanol S
- 6 Contenido del envase y otras informaciones

1 Qué es PATANOL / PATANOL S y para qué se utiliza

Qué es Patanol / Patanol S

Patanol 0,1% y Patanol S 0,2%, colirio en solución, contiene la sustancia activa clorhidrato de olopatadina, perteneciente a un grupo de medicamentos llamados oftalmológicos; descongestivos y antialérgicos.

Para qué se utiliza Patanol / Patanol S

Patanol se utiliza para el tratamiento de la picazón o comezón ocular, provocada por la conjuntivitis alérgica.

Patanol S se utilizan para el tratamiento de la picazón ocular asociada con la conjuntivitis alérgica.

Cómo actúa Patanol / Patanol S

Patanol / Patanol S actúa reduciendo la intensidad de la reacción alérgica.

Si tiene alguna duda respecto a cómo actúa Patanol / Patanol S o a los motivos por los que le han recetado este medicamento, pregunte al médico, al farmacéutico o al profesional sanitario que lo atiende.

2 Qué debe saber antes y durante el tratamiento con Patanol / Patanol S

Siga al pie de la letra todas las instrucciones del médico, que pueden diferir de la información general contenida en este prospecto.

No utilice Patanol / Patanol S

- Si es alérgico a la olopatadina o a cualquiera de los otros componentes de Patanol / Patanol S

Si es su caso, no use Patanol / Patanol S y dígaselo al médico.

Niños y adolescentes (menores de 18 años)

Patanol puede usarse en niños o adolescentes de entre 3 y 18 años en las mismas dosis que en los adultos.

Patanol S pueden usarse en niños o adolescentes de entre 2 y 18 años en las mismas dosis que en los adultos.

Personas de edad avanzada (65 años en adelante)

Si tiene 65 años o más, puede usar Patanol / Patanol S en las mismas dosis que los demás adultos.

Uso de otros fármacos (interacciones con otros medicamentos, incluidos los productos biológicos y las vacunas)

Si está usando, ha usado recientemente o podría usar algún otro medicamento, incluidos los de venta sin receta, dígaselo al médico o al farmacéutico.

Embarazo y lactancia

Si está embarazada o amamantando, sospecha que puede estar embarazada o planea estarlo, consulte al médico o al farmacéutico antes de usar este medicamento.

Información importante acerca de uno de los componentes de Patanol / Patanol S

Patanol / Patanol S contiene cloruro de benzalconio, que puede causar irritación ocular y podría colorear los lentes de contacto blandos. Hay que quitarse los lentes de contacto antes de instilarse Patanol / Patanol S y no volver a ponérselos hasta 15 minutos después.

3 Cómo usar Patanol / Patanol S

No supere la dosis recomendada que le ha recetado el médico.

Utilice siempre este medicamento exactamente como se lo ha indicado el médico o el farmacéutico. Si tiene alguna duda, consulte al médico o al farmacéutico.

Cantidad de Patanol / Patanol S que hay que usar

Patanol: una gota en el ojo u ojos afectados dos veces al día (cada 6 - 8 horas). El tratamiento puede mantenerse hasta un máximo de 4 meses si se considera necesario.

Patanol S: una gota en cada ojo afectado una vez al día.

Modo de administración

- Use Patanol / Patanol S únicamente para instilárselo en el ojo.
- Si, tras desenroscar la tapa del frasco, la arandela del precinto de seguridad queda suelta, retírela antes de usar el producto. *[Aplicable únicamente a los colirios que llevan precinto de seguridad con arandela.]*
- Para evitar una posible contaminación, la punta del cuentagotas no debe tocar ninguna superficie. Tampoco debe entrar en contacto con el ojo, ya que podría lesionarlo.
- Si la gota no cae en el ojo, inténtelo de nuevo.
- Si luego mantiene los ojos cerrados durante 2 minutos (aplicando la oclusión nasolagrimal), logrará que el medicamento se absorba menos en otras partes del organismo (absorción sistémica), lo cual puede reducir los efectos secundarios generales en dichas partes y aumentar la actividad farmacológica local.
- Mantenga el frasco bien cerrado cuando no lo esté usando.
- Si está utilizando más de un medicamento ocular, debe dejar pasar al menos 5 minutos entre la administración de uno y la del siguiente. Las pomadas oftálmicas deben aplicarse en último lugar.
- Si el ojo está enrojecido, no se ponga ningún lente de contacto.
- Patanol / Patanol S no debe usarse para tratar una irritación causada por lentes de contacto.

Si usa más Patanol / Patanol S del que debiera

Si se instila más Patanol / Patanol S del que debiera, enjuáguelo por completo con agua templada. No se instile más gotas hasta que llegue la hora de la siguiente dosis habitual.

Si olvidó usar Patanol / Patanol S

Si olvidó usar Patanol / Patanol S instílese la dosis siguiente según lo previsto, pero si ya es casi la hora de la siguiente dosis, sátese la que olvidó y siga con su horario habitual de administración. **No** se administre una dosis doble para compensar la olvidada.

Si tiene más dudas sobre el uso de este medicamento, consulte al médico o al farmacéutico.

4 Posibles efectos secundarios

Como todos los medicamentos, Patanol / Patanol S puede causar efectos secundarios, aunque no todos los pacientes los presentan.

Si presenta algún efecto secundario grave, **deje de usar este medicamento e informe al médico de inmediato.**

Se han observado los efectos secundarios siguientes con el uso de **Patanol**:

Frecuentes: *pueden afectar a hasta 1 de cada 10 personas.*

- Efectos en el ojo: molestia ocular.

Infrecuentes: *pueden afectar a hasta 1 de cada 100 personas.*

- Efectos en el ojo: inflamación de la superficie ocular con o sin lesión de la superficie (signos de queratitis punteada), dolor ocular, ojo seco, visión borrosa, hinchazón de los párpados, picazón ocular, secreción ocular, enrojecimiento ocular.
- Efectos secundarios generales: dolor de cabeza, alteración del sentido del gusto (disgeusia), sequedad nasal, cansancio (fatiga).

Raros: *pueden afectar a hasta 1 de cada 1000 personas.*

- Efectos en el ojo: aumento de la sensibilidad de los ojos a la luz (fotofobia), enrojecimiento de los párpados.
- Efectos secundarios generales: mareo, erupción con picazón (dermatitis de contacto).

Frecuencia desconocida: *los datos disponibles no permiten estimar su frecuencia.*

- Efectos en el ojo: ojo lloroso (lagrimeo aumentado).
- Efectos secundarios generales: alergia, náuseas.

Se han observado los efectos secundarios siguientes con el uso de **Patanol S**:

Frecuentes: *pueden afectar a hasta 1 de cada 10 personas.*

- Efectos en el ojo: molestia ocular.

Infrecuentes: *pueden afectar a hasta 1 de cada 100 personas.*

- Efectos en el ojo: ojo seco, visión borrosa, picazón ocular, enrojecimiento ocular, costra en el párpado.
- Efectos secundarios generales: dolor de cabeza, alteración del sentido del gusto (disgeusia), sequedad nasal.

Raros: *pueden afectar a hasta 1 de cada 1000 personas.*

- Efectos secundarios generales: boca seca.

Frecuencia desconocida: *los datos disponibles no permiten estimar la frecuencia*

- Efectos en el ojo: ojo lloroso (lagrimeo aumentado).
- Efectos secundarios generales: alergia, náuseas.

Si nota algún efecto secundario no enumerado en este prospecto, informe al médico, al farmacéutico o al profesional sanitario que lo atiende.

5 Conservación de Patanol / Patanol S

- Mantenga este medicamento fuera de la vista y del alcance de los niños.
- No use este medicamento después de la fecha de caducidad.
- Patanol: Almacenar a menos de 25°C. Patanol S: Almacenar a menos de 30°C.

6 Contenido del envase y otras informaciones

Contenido de Patanol / Patanol S

Patanol

La **sustancia activa** de Patanol es 1,11 mg de clorhidrato de olopatadina en un ml de solución (0,1%).

Los **otros componentes** de **Patanol** son fosfato de sodio dibásico anhidro, cloruro de sodio, cloruro de benzalconio, ácido clorhídrico y/o hidróxido de sodio para ajuste de pH, agua purificada c.s.

Patanol S

La **sustancia activa** de Patanol S es 2,22 mg de clorhidrato de olopatadina en un ml de solución (0,2%).

Los **otros componentes** de **Patanol S** son cloruro de benzalconio, edetato disódico, polividona K 29/32, cloruro de sodio, fosfato de sodio dibásico anhidro, ácido clorhídrico y/o hidróxido de sodio para ajuste de pH, agua purificada c.s.

La información puede diferir en algunos países.

Presentación de Patanol / Patanol S y contenido del envase

Patanol

Patanol se presenta como colirio en solución en frasco de polietileno de baja densidad (PEBD/LDPE) rotulado.

El colirio en solución es una solución entre incolora y amarillo pálido.

Cada colirio en solución contiene 1,11 mg de clorhidrato de olopatadina en un ml de solución (0,1%).

La información puede diferir en algunos países.

Patanol S

Patanol S se presenta como colirio en solución en frasco plástico de polietileno de baja densidad, rotulado, con un tapón dispensador de polietileno de baja densidad y una tapa de polipropileno blanca.

El colirio en solución es una solución entre incolora y amarillo pálido.

Cada colirio en solución contiene 2,22 mg de clorhidrato de olopatadina en un ml de solución (0,2%).

La información puede diferir en algunos países.

Titular de la autorización de comercialización

Novartis Chile S.A.

Fabricante

Ver envase secundario.

Este prospecto fue revisado en Septiembre 2023

Para mayor información favor dirigirse al área médica de Información Médica de Novartis:

informacion.medica@novartis.com

Importado por Novartis Chile S.A.

Rosario Norte 615, piso 8, Las Condes, Santiago, Chile

N/A (17-07-20)