

Departamento de Registro Farmacéutico

EXJADE[®] (deferasirox), comprimidos dispersables
125 mg, 250 mg, 500 mg, comprimidos dispersables

JADENU[®] (deferasirox), comprimidos recubiertos
90 mg, 180 mg, 360 mg, comprimidos recubiertos

Prospecto básico para el paciente

Versión 4.0

Fecha de entrada en vigor: 24 de julio de 2019
Número de referencia (SLC): 2019-PSB/GLC-1065-s
Versión del documento: Última

Propiedad de Novartis
Confidencial
No se usará, divulgará, publicará ni dará a conocer
sin el consentimiento de Novartis.

Lea detenidamente este prospecto antes de que usted o su hijo comience el tratamiento con este medicamento.

Conserve este prospecto. Puede que necesite leerlo de nuevo.

Si tiene alguna duda, consulte al médico, al farmacéutico o al profesional sanitario que lo atiende.

Este medicamento se lo han recetado solo a usted. No lo use para ninguna otra enfermedad y tampoco se lo dé a otra persona. Si lo hace, puede perjudicar la salud de esa persona, aunque presente los mismos signos de enfermedad que usted.

Si algún efecto secundario lo afecta mucho o nota algún efecto secundario no mencionado en este prospecto, dígaselo al médico, al farmacéutico o al profesional sanitario que lo atiende.

Contenido de este prospecto

1	Qué es y para qué se utiliza Exjade®/Jadenu®.....	2
2	Qué necesita saber antes y durante el tratamiento con Exjade/Jadenu.....	3
3	Cómo tomar Exjade/Jadenu.....	6
4	Posibles efectos secundarios.....	9
5	Como conservar Exjade/Jadenu	11
6	Contenido del envase e información adicional.....	11

1 Qué es y para qué se utiliza Exjade®/Jadenu®

Qué es Exjade/Jadenu

Comprimidos dispersables de Exjade

Los comprimidos dispersables de Exjade de 125 mg, 250 mg y 500 mg contienen un principio activo llamado deferasirox. Este medicamento es un quelante de hierro que elimina el exceso de hierro del organismo (también denominado «sobrecarga de hierro»).

Comprimidos recubiertos de Jadenu

Los comprimidos recubiertos de Jadenu de 90 mg, 180 mg y 360 mg contienen un principio activo llamado deferasirox. Este medicamento es un quelante del hierro que elimina el exceso de hierro del organismo (también denominado «sobrecarga de hierro»).

Para qué se utiliza Exjade/Jadenu

- Sobrecarga transfusional de hierro (exceso de hierro que presentan los pacientes que reciben regularmente transfusiones de sangre)

Exjade/Jadenu se usa para tratar la sobrecarga de hierro causada por las transfusiones sanguíneas repetidas. Puede utilizarse para tratar a adultos, adolescentes y niños a partir de los 2 años de edad.

Las transfusiones sanguíneas repetidas pueden ser necesarias en pacientes que sufren ciertos tipos de anemia, como la talasemia, la anemia drepanocítica (drepanocitosis) o los síndromes mielodisplásicos. Sin embargo, dichas transfusiones pueden hacer que se acumule hierro en exceso. Esto se debe a que la sangre contiene hierro y su organismo no tiene una forma natural de eliminar el exceso de hierro que recibe usted con las transfusiones sanguíneas.

- Síndromes talasémicos no dependientes de transfusiones (cantidad excesiva de hierro en pacientes con talasemia que no reciben regularmente transfusiones de sangre)

Exjade/Jadenu se usa para tratar a pacientes que tienen una sobrecarga de hierro asociada a síndromes talasémicos, pero no dependen de transfusiones sanguíneas. En este caso, puede utilizarse para tratar a adultos, adolescentes y niños a partir de los 10 años de edad. En los pacientes con síndromes talasémicos no dependientes de transfusiones, puede desarrollarse con el tiempo una sobrecarga de hierro principalmente debida a la elevada absorción de hierro alimentario como respuesta a la cifra baja de eritrocitos (glóbulos rojos). En los pacientes talasémicos que no reciben regularmente transfusiones de sangre, el aumento de la concentración de hierro suele observarse únicamente en pacientes de 10 años en adelante.

Con el tiempo, el exceso de hierro puede dañar órganos importantes como el hígado y el corazón.

Los medicamentos denominados quelantes del hierro se usan para eliminar el exceso de hierro y reducir el riesgo de que se produzcan daños en los órganos.

Cómo actúa Exjade/Jadenu

Exjade/Jadenu se fija al hierro y elimina el exceso de este elemento, principalmente por las heces.

Consulte al médico, al farmacéutico o al profesional sanitario que le atiende, si tiene alguna duda sobre cómo actúa Exjade/Jadenu o sobre la razón por la que se lo han recetado.

2 Qué necesita saber antes y durante el tratamiento con Exjade/Jadenu

Siga estrictamente las indicaciones del médico. Pueden ser diferentes de la información que se presenta en este prospecto.

No tome Exjade/Jadenu:

- **Si es alérgico** (hipersensible) al deferasirox o a cualquiera de los componentes de Exjade/Jadenu enumerados en el apartado 6 de este prospecto. Si cree que puede ser alérgico, consulte al médico.
- Si tiene problemas renales severos.
- Si el síndrome mielodisplásico que sufre está en un estadio avanzado o si padece un cáncer avanzado.

Si se encuentra en cualquiera de estas circunstancias, **no tome Exjade/Jadenu y consulte al médico.**

Advertencias y precauciones

Antes de tomar Exjade/Jadenu, consulte al médico, al farmacéutico o al profesional sanitario que lo atiende si se encuentra usted en cualquiera de estas circunstancias:

- Si tiene problemas hepáticos o renales.
- Si está tomando o ha tomado recientemente ciertos analgésicos, antiinflamatorios o bisfosfonatos orales (véase el apartado «Uso de otros medicamentos»).
- Si está tomando o ha tomado recientemente medicamentos anticoagulantes (véase el apartado «Uso de otros medicamentos»).
- Si la cifra de plaquetas o de glóbulos blancos es baja en el análisis de sangre.

Si usted presenta cualquiera de los síntomas siguientes durante el tratamiento con Exjade/Jadenu, dígaselo de inmediato al médico, al farmacéutico o al profesional sanitario que lo atiende:

- Si vomita sangre o las heces son de color negro.
- Si sufre con frecuencia ardor de estómago o dolor abdominal (úlceras), particularmente después de comer o de tomar Exjade/Jadenu.
- Si nota que la cantidad de orina que emite ha disminuido severamente (esto es un signo de un problema renal).
- Si presenta una erupción severa, o dificultad para respirar, mareo o hinchazón principalmente de la cara y la garganta (son signos de una reacción alérgica severa).
- Si sufre una combinación de cualquiera de estos síntomas: erupción cutánea; enrojecimiento de la piel; ampollas en los labios, los ojos o la boca; descamación de la piel; fiebre alta; síntomas parecidos a los de la gripe y aumento de tamaño de los ganglios linfáticos (signos de una reacción cutánea severa).
- Si sufre una combinación de somnolencia, dolor en la parte superior derecha del abdomen, coloración amarillenta o aumento de la coloración amarilla de la piel o los ojos, y orina oscura (signos de problemas hepáticos).
- Si presenta problemas de visión o audición.

Seguimiento del tratamiento con Exjade/Jadenu

Antes de comenzar el tratamiento y durante este, le realizarán regularmente diversas pruebas (análisis de sangre, análisis de orina o estudios de resonancia magnética) que servirán para vigilar la cantidad de hierro presente en su organismo (concentración de ferritina, cantidad de hierro en el hígado y el corazón) y saber con qué eficacia está actuando Exjade/Jadenu. Permitirán, asimismo, vigilar el funcionamiento de los riñones (concentración de creatinina en la sangre, presencia de proteínas en la orina) y del hígado (concentración sanguínea de transaminasas, bilirrubina y fosfatasa alcalina). El médico tendrá en cuenta los resultados de estas pruebas a la hora de elegir la dosis de Exjade/Jadenu más adecuada para usted y de decidir cuándo debe dejar de tomar Exjade/Jadenu.

Antes de comenzar el tratamiento, y una vez al año durante este, le examinarán la visión y la audición como medida precautoria.

Si tiene alguna duda sobre el modo de acción de Exjade/Jadenu o el motivo por el que se lo han recetado, consulte al médico, al farmacéutico o al profesional sanitario que lo atiende.

Ancianos (a partir de los 65 años de edad)

Las personas a partir de los 65 años de edad pueden utilizar Exjade/Jadenu en la misma dosis que el resto de adultos. Los pacientes ancianos pueden presentar más efectos secundarios que los pacientes de edad menos avanzada. El médico debe vigilar estrechamente a estos pacientes para detectar posibles efectos secundarios que quizá exijan ajustar la dosis.

Niños y adolescentes (entre 2 y 17 años)

Los adolescentes y los niños pueden utilizar Exjade/Jadenu a partir de los 2 años de edad. El médico ajustará la dosis a medida que el paciente crezca.

Administración de otros medicamentos

Los antiácidos (medicamentos para tratar el ardor de estómago) que contienen aluminio no deben tomarse a la misma hora del día que Exjade/Jadenu.

Indíquelo al médico o al farmacéutico los medicamentos que está recibiendo o que ha recibido recientemente, incluidos los que haya obtenido sin receta.

Entre ellos se encuentran, en particular:

- El midazolam (se emplea para mitigar la ansiedad o angustia y/o para tratar los problemas de conciliación del sueño);
- La ciclosporina (se emplea en el trasplante para impedir el rechazo del órgano trasplantado; se usa también en otras afecciones, como la artritis reumatoide y la dermatitis atópica);
- La simvastatina (utilizada para reducir la concentración de colesterol);
- Los anticonceptivos hormonales (medicamentos para la regulación de la natalidad);
- Ciertos analgésicos o antiinflamatorios (por ejemplo: ácido acetilsalicílico [aspirina], ibuprofeno, corticosteroides);
- Los bisfosfonatos orales (utilizados para tratar la osteoporosis);
- Los anticoagulantes (se usan para tratar o prevenir la coagulación sanguínea);
- La repaglinida (se emplea para tratar la diabetes);
- La rifampicina (utilizada para tratar la tuberculosis);
- La fenitoína y el fenobarbital (se usan para tratar la epilepsia);
- El ritonavir (utilizado en el tratamiento de la infección por el VIH);
- El paclitaxel (se emplea en el tratamiento del cáncer);
- La teofilina (usada para tratar enfermedades respiratorias como el asma);
- El busulfán (usado como tratamiento antes de un trasplante de médula ósea).

Es posible que el médico necesite hacerle análisis de sangre para determinar la concentración de algunos de estos medicamentos. El médico tendrá en cuenta los resultados de estos análisis cuando decida cuáles son las dosis de estos medicamentos más adecuadas para usted.

Administración de Exjade/Jadenu con alimentos y bebidas

Comprimidos dispersables de Exjade

Exjade debe tomarse con el estómago vacío, al menos 30 minutos antes de comer, a ser posible a la misma hora cada día.

No disuelva los comprimidos en bebidas gaseosas ni en leche.

Comprimidos recubiertos y gránulos de Jadenu

Jadenu puede tomarse con el estómago vacío o con una comida ligera (menos del 50% de las calorías procedentes de las grasas), preferiblemente a la misma hora cada día.

Embarazo y lactancia

No se conoce el posible efecto de Exjade/Jadenu sobre la fertilidad humana.

No se recomienda utilizar Exjade/Jadenu durante el embarazo salvo que sea estrictamente necesario. Si está usted embarazada o cree que puede estarlo, dígaselo al médico, este le indicará si puede tomar Exjade/Jadenu durante el embarazo.

No se recomienda la lactancia materna durante el tratamiento con Exjade/Jadenu. Si está dando el pecho a su hijo, dígaselo al médico.

Antes de tomar cualquier medicamento, consulte al médico o al farmacéutico.

Mujeres con posibilidad de quedar embarazadas

Exjade/Jadenu puede reducir el efecto de los anticonceptivos orales y los parches anticonceptivos; por consiguiente, si usted utiliza solo uno u otro de estos dos métodos, corre el riesgo de quedarse embarazada. Debe utilizar un método anticonceptivo adicional o cambiar a otro.

Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas

Si se siente mareado después de tomar Exjade/Jadenu, no conduzca ni utilice ninguna herramienta o máquina hasta que vuelva a sentirse normal.

Información importante sobre algunos componentes de Exjade

Exjade contiene lactosa (azúcar de la leche). Si tiene usted una intolerancia severa a la lactosa, dígaselo al médico antes de tomar Exjade.

3 Cómo tomar Exjade/Jadenu

Tome siempre Exjade/Jadenu tal como le ha indicado el médico. Si tiene alguna duda, consulte al médico o al farmacéutico.

Exjade es una formulación diferente de Jadenu que contiene el mismo principio activo, el deferasirox; sin embargo, la dosis cambiará al pasar de Jadenu a Exjade.

Comprimidos recubiertos de Jadenu

Jadenu es una formulación diferente de Exjade que contiene la misma sustancia activa, el deferasirox; sin embargo, la dosis cambiará al pasar de Exjade a Jadenu.

Qué dosis de Exjade/Jadenu debe tomar

La dosis de Exjade/Jadenu se relaciona con el peso corporal en todos los pacientes. El médico calculará la dosis que usted necesita y le dirá cuántos comprimidos debe tomar cada día.

Comprimidos dispersables de Exjade

La dosis diaria habitual al comenzar el tratamiento es de:

- **20 mg** por kilo de peso en los pacientes que reciben regularmente transfusiones sanguíneas;
- **10 mg** por kilo de peso en los pacientes que no reciben regularmente transfusiones sanguíneas.

Comprimidos recubiertos y gránulos de Jadenu

La dosis diaria habitual al comenzar el tratamiento es de:

- **14 mg** por kilo de peso en los pacientes que reciben regularmente transfusiones sanguíneas;
- **7 mg** por kilo de peso en los pacientes que no reciben regularmente transfusiones sanguíneas.

Es posible que, en función de las necesidades terapéuticas, el médico le recomiende una dosis inicial mayor o menor.

- Dependiendo de cómo responda usted al tratamiento, es posible que el médico lo ajuste más adelante y le indique una dosis mayor o menor.

Comprimidos dispersables de Exjade

La dosis diaria recomendada máxima es de:

- **40 mg** por kilo de peso en los pacientes que reciben regularmente transfusiones sanguíneas;
- **20 mg** por kilo de peso en los pacientes que no reciben regularmente transfusiones sanguíneas.

Comprimidos recubiertos y gránulos de Jadenu

La dosis diaria recomendada máxima es de:

- **28 mg** por kilo de peso en los pacientes que reciben regularmente transfusiones sanguíneas;
- **14 mg** por kilo de peso en los pacientes que no reciben regularmente transfusiones sanguíneas.

Cuándo tomar Exjade/Jadenu

Comprimidos dispersables de Exjade

- Tome Exjade una vez al día, todos los días, aproximadamente a la misma hora.
- Tome los comprimidos con el estómago vacío.
- Luego deje que pasen al menos 30 minutos antes de ingerir alimentos.

Si toma Exjade cada día a la misma hora, le será más fácil recordar cuándo debe tomar los comprimidos.

Cómo tomar Exjade:

- **Eche** el comprimido o los comprimidos en un vaso de agua, jugo de manzana o jugo de naranja (100-200 ml).
- **Remueva** hasta que el comprimido o los comprimidos se hayan disuelto completamente. El líquido del vaso se volverá turbio.
- **Beba** todo el contenido del vaso. Luego añada un poco de agua o de jugo a los restos de medicamento que hayan quedado en el vaso y bébalo también.

No disuelva los comprimidos en bebidas gaseosas ni en leche.

No mastique, rompa ni triture los comprimidos

No ingiera los comprimidos enteros.



Comprimidos recubiertos de Jadenu

- Tome Jadenu una vez al día, todos los días, aproximadamente a la misma hora, con algo de agua.
- Tome los comprimidos con el estómago vacío o con una comida ligera.
- Si no puede tragar los comprimidos enteros, puede triturarlos. Luego espolvoree los comprimidos triturados sobre algún alimento blando, como yogur o compota de manzana. Una vez hecho esto, tómelo de inmediato; no deje nada para más tarde.

Si toma Jadenu cada día a la misma hora, le será más fácil recordar cuándo debe tomar los comprimidos.

Durante cuánto tiempo debe tomar Exjade/Jadenu

Siga tomando Exjade/Jadenu **todos los días mientras su médico se lo indique**. Se trata de un tratamiento a largo plazo que posiblemente dure meses o años. El médico controlará regularmente su afección para comprobar si el tratamiento está teniendo el efecto deseado (véase también el apartado 2: «Seguimiento del tratamiento con Exjade/Jadenu»).

Si tiene alguna duda respecto al tiempo durante el cual debe tomar Exjade/Jadenu, consulte al médico.

Si toma más Exjade/Jadenu del que debiera

Si ha tomado demasiado Exjade/Jadenu, o si alguna persona toma accidentalmente sus comprimidos, póngase de inmediato en contacto con el médico o con el hospital para que le asesoren. Muéstrelle al médico el envase de los comprimidos. Quizá sea necesario instaurar un tratamiento médico urgente. Puede que note efectos como dolor abdominal, diarrea, náuseas y vómitos, y problemas de riñón o hígado que pueden ser graves.

Si olvida tomar Exjade/Jadenu

Si se olvida de tomar una dosis, tómela tan pronto como se acuerde en el transcurso del día. Tome la siguiente dosis en el momento en que estaba prevista. No tome una dosis doble al día siguiente para compensar el comprimido o los comprimidos que olvidó tomar.

Si deja de tomar Exjade/Jadenu

No deje de tomar Exjade/Jadenu a no ser que el médico se lo indique. Si deja de tomarlo, ya no se eliminará el exceso de hierro de su organismo (véase también, el apartado «Durante cuánto tiempo debe tomar Exjade/Jadenu», más atrás).

4 Posibles efectos secundarios

Como ocurre con todos los medicamentos, Exjade/Jadenu puede causar efectos secundarios, aunque no todos los pacientes los padecen.

Deje de tomar Exjade/Jadenu y busque ayuda médica inmediatamente si usted o su hijo sufren alguno de los síntomas que se señalan a continuación.

Síntomas que pueden indicar una reacción alérgica:

- dificultad para respirar o tragar;
- hinchazón de la cara, los labios, la lengua o la garganta;
- picazón severa de la piel, con una erupción rojiza o ronchas. (~~habones~~)

Algunos efectos secundarios pueden ser graves

Si sufre alguno de estos efectos secundarios, **deje de tomar el medicamento y consulte de inmediato al médico.**

Infrecuentes: *pueden afectar a hasta 1 de cada 100 pacientes.*

- Hematesis (vómitos que contienen sangre) o heces de color negro.
- Ardor de estómago, dolor de estómago o dolor abdominal frecuentes, particularmente después de comer o de tomar el fármaco (signos de úlcera).
- Disminución severa de la cantidad de orina que emite (esto es un signo de un problema renal).
- Una combinación de somnolencia, dolor en la zona superior derecha del abdomen, coloración amarillenta o aumento de la coloración amarillenta de la piel o los ojos, y orina oscura (son signos de problemas hepáticos).

- Pérdida parcial de la visión.
- Dolor de espalda repentino o dolor en el lado derecho del abdomen (son signos de cálculos en la vesícula biliar).
- Dolor severo en la parte superior del abdomen (pancreatitis).

Raros: *pueden afectar a hasta 1 de cada 10 000 pacientes.*

- Reacciones cutáneas severas que podrían incluir: erupción, enrojecimiento de la piel, ampollas en los labios, los ojos o la boca, descamación de la piel, fiebre alta, síntomas parecidos a los de la gripe y ganglios linfáticos agrandados).

Frecuencia desconocida: *la frecuencia no puede calcularse a partir de los datos disponibles.*

- Perforación de la pared gástrica o intestinal que puede ser dolorosa y provocar náuseas.

Otros efectos secundarios posibles

A continuación se enumeran otros efectos secundarios posibles. Si estos efectos secundarios llegan a ser severos, consulte al médico, al farmacéutico o al profesional sanitario que lo atiende.

Muy frecuentes: *pueden afectar a más de 1 de cada 10 pacientes.*

- Resultados anormales en el análisis sanguíneo de la función renal (concentración de creatinina elevada)

Frecuentes: *pueden afectar a hasta 1 de cada 10 pacientes.*

- Trastornos gastrointestinales, como náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal, meteorismo (aumento del gas intestinal), estreñimiento, indigestión
- Erupción
- Cefalea
- Resultados anormales en el análisis sanguíneo de la función hepática (concentración de transaminasas elevada)
- Prurito (picor)
- Proteínas en la orina.

Infrecuentes: *pueden afectar a hasta 1 de cada 100 pacientes.*

- Mareo
- Fiebre
- Visión borrosa
- Hipoacusia (disminución de la capacidad auditiva)
- Dolor de garganta
- Hinchazón de los brazos o las piernas
- Cambio del color de la piel
- Ansiedad
- Trastorno del sueño
- Cansancio.

Frecuencia desconocida: *no es posible calcular la frecuencia a partir de los datos disponibles.*

- Caída del cabello

- Descenso de las cifras de células que intervienen en la coagulación de la sangre (trombocitopenia), de glóbulos rojos (anemia agravada) y de glóbulos blancos (neutropenia).

Si nota usted cualquier efecto secundario que no se haya mencionado en este prospecto, comuníquese al médico, al farmacéutico o al profesional sanitario que lo atiende.

5 **Cómo conservar de Exjade/Jadenu**

- Manténgalo fuera del alcance y de la vista de los niños.
- No use Exjade/Jadenu después de la fecha de caducidad («EXP») que se indica en el envase. La fecha de caducidad se refiere al último día del mes indicado.
- Consérvese en el envase original para protegerlo de la humedad.
- Información específica de cada país: condiciones de conservación, en función del envase.

Exjade: Almacenar a no más de 30°C.

Jadenu: Almacenar a no más de 30°C, protegido de la humedad.

No utilice ningún envase que esté dañado o muestre signos de manipulación.

Pregunte al farmacéutico cómo desechar los medicamentos que ya no usa.

6 **Contenido del envase e información adicional**

Qué contiene Exjade/Jadenu

Comprimidos dispersables de Exjade

- La sustancia activa es el deferasirox.
- Los demás componentes son los siguientes: crospovidona, lactosa monohidrato (200 mesh y spray dried), celulosa microcristalina, polividona, laurilsulfato de sodio, dióxido de silicio coloidal y estearato de magnesio.

Comprimidos recubiertos de Jadenu

- La sustancia activa es el deferasirox.
- Los demás componentes son los siguientes: celulosa microcristalina, crospovidona, povidona (K30), estearato de magnesio, dióxido de silicio coloidal, poloxámero 188; material de recubrimiento: hipromelosa, dióxido de titanio, macrogol (4000), talco, colorante FD&C azul #2, laca aluminica.

Esta información puede variar en algunos países.

Qué es Exjade/Jadenu - Naturaleza y contenido del envase

Comprimidos dispersables de Exjade

- Exjade se presenta en comprimidos dispersables. Los comprimidos son redondos, planos y de color blanco a ligeramente amarillento. Cada comprimido contiene 125 mg, 250 mg o 500 mg de deferasirox.

- Los comprimidos dispersables de Exjade 125 mg contienen 125 mg de deferasirox. En cada comprimido figura grabada la dosis farmacéutica («J 125») en una cara y «NVR» en la otra.
- Los comprimidos dispersables de Exjade 250 mg contienen 250 mg de deferasirox. En cada comprimido figura grabada la dosis farmacéutica («J 250») en una cara y «NVR» en la otra.
- Los comprimidos dispersables de Exjade 500 mg contienen 500 mg de deferasirox. En cada comprimido figura grabada la dosis farmacéutica («J 500») en una cara y «NVR» en la otra.

Esta información puede variar en algunos países.

Comprimidos recubiertos de Jadenu

- Comprimidos recubiertos de Jadenu 90 mg: Comprimidos recubiertos de color azul claro, con forma aproximadamente oval y bordes biselados; presenta la inscripción «NVR» en una cara y, en la otra cara, la inscripción «90», formando un ángulo ligeramente hacia arriba respecto a la horizontal y situada entre dos líneas curvas.
- Comprimidos recubiertos de Jadenu 180 mg: Comprimidos recubiertos de color azul medio con forma aproximadamente oval y bordes biselados; presenta la inscripción «NVR» en una cara y, en la otra cara, la inscripción «180», formando un ángulo ligeramente hacia arriba respecto a la horizontal y entre dos líneas curvas.
- Comprimidos recubiertos de Jadenu 360 mg: Comprimidos recubiertos de color azul oscuro con forma aproximadamente oval y bordes biselados; presenta la inscripción «NVR» en una cara y, en la otra cara, la inscripción «360», formando un ángulo ligeramente hacia arriba respecto a la horizontal y situada entre dos líneas curvas.

Esta información puede variar en algunos países.

Titular de la autorización de comercialización

Novartis Chile

Fabricante

Ver envase secundario

Si tiene alguna pregunta sobre este medicamento, comuníquese con su médico o farmacéutico.

Para mayor información favor dirigirse al área de información Médica de Novartis:
información.medica@novartis.com

2019-PSB/GLC-1065-s